

CLINIQUE VETERINAIRE DES MARCHES DE BRETAGNE

Zone de la Meslais
4, rue Pierre Harel
35133 LECOUSSE

2 bis place de la République
35300 FOUGERES

47, Bd du Maréchal Leclerc
35 460 ST BRICE EN COGLES

LETTRE D'INFORMATION MAI 2022

Surveillance parasitaire des génisses

Certaines génisses sont au pâturage et ceci depuis quelques semaines. Il est peu probable que les parcelles aient été assainies par l'hiver peu rigoureux que nous avons connu, aussi le risque de contamination des génisses est non négligeable.

Plutôt que de mettre en place dès maintenant un traitement préventif à l'aveugle, il est conseillé d'avoir recours à des examens coproscopiques sur les génisses (entre 4 et 5) environ 6 à 8 semaines après la mise à l'herbe.

En fonction des résultats et de la gestion de votre pâturage, nous pourrions vous conseiller un traitement adapté à votre élevage.

Les tiques sont déjà là !

Avec le printemps que nous avons, les tiques, comme les mouches, sont déjà présentes actuellement. Les tiques peuvent véhiculer des maladies (parfois plusieurs germes en même temps) et les transmettre environ 24h après s'être fixées aux animaux.

Les maladies transmises par les tiques le plus souvent rencontrées sont la piroplasmose, l'ehrlichiose et la fièvre Q. Ces maladies se traduisent assez souvent par une forte fièvre pouvant toucher un bovin ou une partie du troupeau et des symptômes variables selon les maladies transmises : de la toux, quelquefois un œdème au niveau des pâturons (ehrlichiose) ou une modification de la couleur des urines (exemple : urine couleur « marc de café » en cas de piroplasmose).

Les tiques se localisent préférentiellement au niveau des aisselles des vaches et entre la mamelle et les pattes arrière. Elles ne sont pas forcément visibles facilement et, pour les localiser, la palpation des zones entre les pattes et le thorax ou le ventre peut s'avérer nécessaire.

Les tiques affectionnent particulièrement les herbes hautes, les broussailles, les zones ombragées et humides ainsi que les bordures de forêts ou de bois.

Pour se prémunir des tiques, il existe plusieurs solutions :

- Débroussailler 1 mètre en arrière des clôtures. Cela réduit l'exposition des animaux aux tiques de manière considérable.
- Traiter les animaux exposés avec des antiparasitaires externe ou des répulsifs. Attention ! la plupart des médicaments ayant des actions « anti-tiques » ont des délais d'attente pour le lait.
- Mettre de préférence les génisses dans les parcelles connues pour être occupées par des tiques. Cela permettra de développer une immunité de protection quand les génisses seront devenues adultes dans le cas de la piroplasmose.

Idéalement, les prélèvements de bouses doivent être effectués directement à partir du rectum. Vous pouvez également ramasser des bouses que vous avez vu tomber.

Pour rappel : chez l'homme (mais aussi chez l'animal), les tiques transmettent une bactérie responsable de la maladie de Lyme. Attention lorsque vous marchez auprès des fourrés et des taillis...



Oxylis, antiparasitaire externe naturel

Oxylis est un antiparasitaire constitué de deux molécules à efficacité répulsive :

- Le PMD : molécule issue de l'huile essentielle de citronnelle
- Le Géraniol : molécule issue de l'huile essentielle de géranium

MOUCHES, TIQUES, POUX, MOUCHERONS :

Oxylis s'applique en SPRAY sur les zones de localisation préférentielle des parasites. Adapter la fréquence de renouvellement à la pression parasitaire.

GALES :

Oxylis s'applique en SPRAY sur les lésions. 2 fois à 15 jours d'intervalle


Il contient un colorant vert naturel (extrait de luzerne) pour identifier les animaux traités et n'a pas de temps d'attente. Il est utilisable sur les jeunes animaux, en gestation ou lactation

Le drenchage des veaux ? Rien de plus simple avec le Trusti Tuber !

La prise de colostrum à la naissance est déterminante pour la santé du veau. Nous avons référencé depuis quelques années le Trusti Tuber qui concilie à la fois **facilité d'utilisation, sécurité et confort pour le veau**. Voici les principales recommandations d'utilisation :



Faire avaler le tube rigide jusqu'à la butée.



Faire coulisser le tube flexible dans le tube rigide jusqu'à la bague de blocage.

Il est possible de vérifier le bon positionnement du tube flexible en palpant le cou du veau du côté gauche.



Réglage de la bague de blocage : le marquage du poids correspond à une longueur minimum d'introduction du tube flexible à atteindre (ne pas sous-estimer le poids du veau ou, en cas d'administration à plusieurs veaux, réglez la bague en fonction du veau le plus lourd).



Levez le bidon contenant le colostrum. Pas besoin de régler le débit. Une fois le bidon vide, retirez d'abord le tube flexible puis le tube rigide.



Le saviez-vous ?
Oxylis est agréé en bio !



Le Kit Trusti Tuber coûte **59€ HT**

Le saviez-vous ? Si vous avez des craintes concernant le drenchage des veaux, nous pouvons vous faire une démonstration !